

Analyses médicales

45 a, route des Acacias
Case postale 1109
1211 GENEVE 26
Tél. +41 22 309 15 20
Fax +41 22 343 30 44

heures d'ouverture :
lun.-ven. 7 h 30 - 18 h 30
samedi 8 h - 17 h

courriel : info@labomgd.ch
internet : www.labomgd.ch

LabomGD
analyses médicales

Demande d'examen (spermogramme)		
Nom (Mme, Mlle, M., Enf.)		Date de naissance jour année
Prénom		mois
Adresse		Assurance
Ville (No postal)	tél. privé	tél. prof.

Remarque et/ou indications cliniques	Date : Heure :	Médecin : Dr
		Copie(s) :

Nom de la conjointe (si lavage de sperme) :

Le sperme a été prélevé par masturbation / retrait à _____ heure

Le prélèvement est complet / incomplet

Le nombre de jours d'abstinence est de _____ jours

Nombre de spermogramme 1er 2ème 3ème

S'il s'avère nécessaire d'effectuer deux spermogrammes consécutifs, il est recommandé de respecter un délai compris entre 1 et 3 semaines.

Traitement médicamenteux oui non

Maladie dans les 6 derniers mois oui non

Vasectomie, date de l'opération :

SPERMOGRAMME (uniquement sur rdv)

- Spermogramme complet (avec la chimie du sperme)
- Spermogramme sans chimie
- Spermogramme post-vasectomie
- Lavage de sperme
- Test post-coïtal
- Ac. anti-spermatozoïdes

SPERME (microbiologie)

- Culture complète (y compris mycoplasma, ureaplasma et levures)
- Chlamydia trachomatis PCR
- Neisseria gonorrhoeae PCR
- Mycoplasma genitalium PCR

➔ Voir instructions pour le prélèvement au verso

Visa :

INSTRUCTIONS POUR LE PRELEVEMENT DU SPERME

1. La meilleure façon de prélever le sperme est la masturbation.
Le retrait (*coïtus interruptus*) peut être utilisé si nécessaire. Il n'est toutefois pas recommandé, car les premières fractions de l'éjaculat, qui risquent d'être perdues, contiennent la plus forte concentration en spermatozoïdes.
Les préservatifs ne doivent pas être employés, parce qu'ils renferment des substances qui détruisent les spermatozoïdes.
2. S'abstenir de toute éjaculation pendant 2 à 7 jours avant le prélèvement (pas plus de 7 jours).
3. Le sperme doit être apporté au laboratoire **le plus vite possible** (dans l'heure qui suit l'éjaculation).
Le sperme ne doit pas être refroidi (en dessous de 18°C) **ou chauffé** (au-dessus de 40°C). Pour éviter tout refroidissement, le récipient en plastique doit être préchauffé à la température ambiante ou à celle du corps. Dans l'évaluation des propriétés biologiques d'un sperme, la mobilité est d'une grande importance. C'est pourquoi la protection contre le froid est absolument nécessaire.
4. Si une partie de l'éjaculat est perdue lors du prélèvement, le signaler. Il faut cependant comprendre que la valeur diagnostique du spermogramme est fortement diminuée, si l'analyse est faite sur une fraction seulement de l'éjaculat.
5. Il est également important de noter l'heure du prélèvement.

APPORTEZ LE SPERME LE MATIN AVANT 10 h, SVP, au laboratoire, 4^e étage du 45A, route des Acacias, du LUNDI au VENDREDI, jamais le samedi.

PLACES de PARC pour VISITEURS DEVANT L'IMMEUBLE

Remarques :